

Stabilan 750 SL**Kasvunsäädö****Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen 51 artiklaan****Varoitus**

Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller.

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.

Haitallista joutuessaan iholle. Skadligt vid hudkontakt.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Stabilan 750 SL –valmisteen Minor Use käyttökohteet ja –ohjeet vähäisiin käyttötarkoituksiin.

Virallisesti tarkastettujen käyttökohteiden lisäksi valmisteen käyttö on sallittu vähäiseen käyttötarkoitukseen (minor use) koristekasvien kasvunsäätöön kasvihuoneessa käyttäjän omalla vastuulla.

Tehoaine: klormekvattikloridi 750 g/l

Valmistetyyppi: SL

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Varsinainen käyttötarkoitus

Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, kauran ja timotein siemenviljelysten kasvun säätelyyn.

Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use)

Kasvunsäätöön koristekasveilla kasvihuoneessa.

Tuotevastuu ja vastuu käytöstä

Käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokkuustestejä kuin varsinaisessa luvassa. Monet tekijät, kuten sää, kasvualusta, lajike, resistenssi, ruiskutustekniikka ja muu käyttötapa voivat vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. Kauppapuutarhaliitto ry ei vastaa tuotteen väärästä tai käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) -luvan haltija ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä

vahingoista tai tulon-, ansion- tai muista vastaavista menetyksistä. Käännä valmisteen toimitajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä aineen käytöstä.

Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista Stabilan 750 SL -valmisteen käytössä niissä käyttökohteissa, joita vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) -lupa koskee. Valmistaja Nufarm Deutschland GmbH vastaa siitä, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjä, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on lisäksi käytettävä kasvojen-/ silmiensuojainta.

Työhygieeninen varoaika

12 tuntia käsittelystä. Käsitellyssä kasvustossa voidaan kuitenkin työskennellä pitkähihaisissa ja -lahkeisissa vaatteissa ja kemikaalin kestävässä suojakäsineissä, kun ruiskutusnestettä on kuivunut kasvustosta ja kasvihuonetta on tuuletettu vähintään kaksi tuntia.

Käyttöohje

KORISTEKASVIEN KASVUNSÄÄTELY KASVIHUONEISSA

Käyttö ruiskutteena

50-100 litraa ruiskutusnestettä/1000 m² tai riittävä määrä, jotta kasvit peittyvät hyvin. Käyttökohteissa, joissa sallittu useampia käyttökertoja, uusintakäsittely, ellei toisin ole mainittu, 2-3 viikon välein max käyttömäärä huomioiden (tehoainetta max 2,6 kg/ha viljelyjakson aikana).

Käyttökohte	Käsittelykerrat, ensimmäisen käsittelyn ajankohta*	Käyttömäärä (ml/100 l vettä)
<i>Abutilon x hybridum</i> (vaahtera-aulio)	1 kerta, kasvien ollessa noin 10 cm	95 - 160
<i>Aphelandra squarrosa</i> (leopoldinkukka)	1 kerta, kasvin ollessa 10–15 cm	240 - 300
<i>Begonia x cheimantha</i> (annansilmä)	1 kerta, versonnan alettua latvonnan jälkeen	95 - 120
<i>Begonia x hiemalis</i> (pauliinabegonia)	2-4 kertaa, lajikkeesta ja vuodenaajasta riippuen, 1. kerta heti lyhytpäiväkäsittelyn alkaessa	95 - 120
<i>Begonia tuberhybrida</i> (mukulabegonia)	1 kerta, taimien ollessa n. 10 cm	95 - 120
<i>Calceolaria speciosa</i>	2 kertaa, 1. kerta kukkanuppujen ollessa	55

(iso tohvelikukka)	1-2 mm	
<i>Cataranthus roseus</i> (punatalvio)	1 kerta, latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	120 - 160
<i>Clerodendrum thomsoriae</i> (kohtalonpensas)	1-2 kertaa, 1. kerta heti latvonnan jälkeen	120 - 185
<i>Euphorbia pulcherrima</i> (joulutähti)	8-10 kertaa, 1. kerta latvomattomille taimille viikko istutuksen jälkeen, latvotuille 2 viikkoa latvonnan jälkeen. Kasvun ollessa voimakas uusintakäsittely 4 vuorokauden kuluttua. Viimeinen pituuskasvun hillitsemiseksi tehty käsittely ennen 15.10.	240
<i>Euphorbia pulcherrima</i> (joulutähti)	Suojuslehtien alkaessa värittyä, "tähten" laadun parantamiseksi	120 - 160
<i>Fuchsia x hybridum</i> (verenpisara)	2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm	185 - 240
<i>Hibiscus spp.</i> (kiinanruusu)	2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm	95 - 160
<i>Pachystachus lutea</i> (kultakäpy)	3-4 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	95 - 120
<i>Pelargonium hortorum</i> (kotipelargoni, Zonale-ryhmä)	1-2 kertaa, 1. kerta 2 viikkoa latvonnan jälkeen	160 - 185
<i>Pelargonium peltatum</i> (riippapelargoni)	1-2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 10–12 cm	160 - 185
<i>Pelargonium domesticum</i> (jalopelargoni)	2-3 kertaa, 1. kerta latvomattomille taimille	240 - 300
<i>Rosa (äitienpäiväruusu)</i>	2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm, käsittelyväli 8 vrk	300
<i>Sinningia speciosa</i> (gloksiniat, suppilokukat)	2-3 kertaa, 1. kerta lehtien ollessa 10–12 cm pitkiä	120 - 185
<i>Dianthus caryophyllus</i> (neilikka)	2 kertaa, 1. kerta lyhytpäiväkäsittelyn alkaessa, uusinta 2 viikkoa myöhemmin	500 - 600
<i>Chrysanthemum frutescens</i> (margareeta)	2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	240 - 300

Käyttö kasteluliuksena

Käyttökohde	Max 1. käyttökerta	Käyttömäärä (ml/100 l vettä)
<i>Achimenes x hybrida</i> (torpankukka)	Taimien ollessa 5-8 cm	185 - 300

<i>Aphelandra squarrosa</i> (leopoldinkukka)	Taimien ollessa 10 - 15 cm	370 - 450
<i>Pelargonium x hortorum</i> (kotipelargoni, Zonale-ryhmä)	2 viikkoa latvonnan jälkeen	150 - 300
<i>Euphorbia fulgens</i> (koralliköynnös)	1. kerta versojen ollessa 20–30 cm	120 - 185
<i>Argyranthemum frutescens</i> (marketat)	Latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	300

Fytotoksisuus

Käsittelyn jälkeen voi esiintyä ohimenevää kloroosia. Suuremmat käyttömäärät voivat aiheuttaa vioituksia. Vastaistutettuja neilikantaimia saa käsitellä aikaisintaan 10 päivän kuluttua latvomista ja pitkän päivän käsittelyssä olevia aikaisintaan 3 viikon kuluttua valotuksen aloittamisesta

Ruiskutusnesteen valmistus

Tuotepakkausta ravistetaan ennen avaamista. Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen siihen lisätään valmiste sekoituspumpun käydessä. Tämän jälkeen tankki täytetään vedellä sekoittajan käydessä. Myös ruiskutus tehdään sekoituspumpun käydessä. Käytä valmis seos muutaman tunnin kuluessa. Älä valmista kerralla tarvetta enempää ruiskutusliuosta.

Ruiskutustekniikka

Stabilan 750 SL -valmiste voidaan ruiskuttaa tavallisilla kasvinsuojeluruiskuilla. Valmisteen tehon ja tasaisen lopputuloksen kannalta on ratkaisevaa, että ruiskutus jakaantuu mahdollisimman tasaisesti ja koko kasvi kastuu ruiskutuksessa. Laimennosta ruiskutetaan tasaisesti siten, että koko kasvusto peittyy. Nestemäärä sopeutetaan lehtimassan mukaan. Ruiskutetaan tippumispiisteeseen.

Kasvien tulee olla hyvässä nestejännityksessä ja käsittely tehdään aikaisin aamulla, jolloin lehdet kuivuvat ennen kuin aurinko voi alkaa polttaa niitä. Valmiste voidaan ruiskuttaa myös illalla, jos halutaan pelata varman päälle.

Huomautukset

On tärkeää, etteivät käsiteltävät kasvit ole stressaantuneita kuivuuden, korkean lämpötilan, kasvitautilien tai muiden olosuhteiden takia. Stressaantuneiden kasvien käsitteleminen voi aiheuttaa vakavia vioituksia, kuten lehtien tippumista tai palamista. Vioitukset eivät yleensä tapa kasvia, mutta tekevät siitä myyntikelvottoman.

Säilytetään kuivassa ja viileässä varastossa alkuperäispakkauksessaan. Suojeltava kylmältä. Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta.

Luvan haltija: Nufarm Deutschland GmbH

Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) -luvan haltija:

Kauppapuutarhaliitto ry, Veljestentie 16, 00730 Helsinki

Yhteyshenkilö: Niina Kangas

puh. 045 7733 2662, s-posti: etunimi.sukunimi@kauppapuutarhaliitto.fi

Valmistaja: Minor Use -luvan haltija täyttää

Edustaja Suomessa: Minor Use -luvan haltija täyttää

Rekisterinumero: 2860

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: XXXXX

Nettopaino- tai tilavuus: 000

Lupa käytön laajentamisesta vähäisiin käyttötarkoituksiin, Minor use, on voimassa 28.2.2028 saakka.